

Je vois des "trucs" sur les trayons, que faire ?

Les trayons sont bien armés pour protéger la vache des infections mammaires ①. Mais ils sont fragiles et c'est en passant par leur sphincter que les bactéries entraînent mammites cliniques ou augmentation de cellules. Toute altération de leur peau ou de leur élasticité a des répercussions fortes sur les risques d'infection. Connaître les lésions, les dépister à la traite ou lors de traitements, permet d'agir. Certains signes sont permanents, d'autres apparaissent au fil du temps ou après la traite.



GDS Ileperlier

→ Je vois des choses permanentes sur les trayons

Trayon bouché

Le canal du trayon est bouché, le lait ne sort pas.

→ À FAIRE :

- 1/ Ne pas forcer le canal avec une sonde
- 2/ Ne pas traire ce quartier
- 3/ Surveiller la santé de la vache
- 4/ Prévoir réforme

Verrues / Papillomes

Ce sont des excroissances dues à des virus spécifiques des bovins. Souvent de petite taille, elles sont présentes surtout sur les jeunes animaux et ont tendance à régresser après 24 mois. Elles peuvent être le reflet de déséquilibre alimentaire ②. Elles posent problème si leur taille et leur localisation empêche une bonne désinfection et la pose du gobelet trayeur.

→ À FAIRE :

- 1/ Assurer une complémentation minérale, vitamines et oligoéléments.
- 2/ Opter pour des produits d'hygiène virucides



Ch Mompas



GDS Bretagne

3/ Contacter son vétérinaire pour lésions grosses ou mal situées : une chirurgie est possible. ③

4/ Réformer les cas majeurs

→ Des choses apparaissent sur les trayons

Plaies de trayon

Ces traumatismes nécessitent rapidement une chirurgie pour bien cicatriser. La résolution des plaies profondes est incertaine si le canal du trayon est touché.

→ À FAIRE :

- 1/ Contacter son vétérinaire pour chirurgie

Déshydratation, gerçures, crevasses


Lors de déshydratation, la peau est fripée et plus ou moins rugueuse selon le stade. Le trayon est moins élastique. Il devient plus fragile pendant la traite ou quand l'environnement est agressif : de la déshydratation ④, on passe aux gerçures ⑤ puis aux crevasses ⑥.



Ch Mompas



I. Leperlier



On attribue les gerçures et crevasses circulaires sur le trayon aux conditions environnementales (froid, humidité). Les gerçures et crevasses verticales ou circulaires à la base du trayon sont plutôt dues au manchon trayeur.

→ À FAIRE :

- 1/ Utiliser des produits cosmétiques pour les lavettes et le trempage
- 2/ Contacter le technicien Opti'Traite® et vérifier l'usure des manchons
- 3/ Assurer un abreuvement correct (1 abreuvoir pour 10 vaches)
- 4/ Gérer les lieux de vie vis-à-vis de l'humidité et des courants d'air

Érythèmes, brûlures, ulcères

Il s'agit de réactions de la peau à cause de certaines maladies générales, d'allergies (photosensibilisation) mais le plus souvent elles sont dues à des produits agressifs (erreur ou qualité médiocre). Une inflammation minime donnera un érythème ⑦. Lors d'inflammation plus profonde, on observe des brûlures ⑧ voire des ulcères ⑨.

→ À FAIRE :

- 1/ Contacter son vétérinaire surtout si plusieurs quartiers et/ou plusieurs vaches sont touchés



I. Leperlier



GDS Bretagne



2/ Utiliser des produits cosmétiques jusqu'à guérison

3/ Confiner la vache (photosensibilisation)

Pseudo variole

Cette infection est liée à un Poxvirus qui provoque des petites croûtes sur les trayons ⑩. Attention, c'est une zoonose. Chez l'homme c'est "la maladie du trayeur" et elle provoque des lésions semblables : vésicules et papules très prurigineuses.



GDS Bretagne

→ À FAIRE :

- 1/ Porter en permanence des gants à la traite (même sans lésions)
- 2/ Utiliser des cosmétiques virucides
- 3/ Traire les vaches atteintes en dernier ou désinfecter les manchons

Hyperkératose

Il s'agit d'une anomalie de production ou d'élimination de la kératine naturelle du sphincter. Lors de traumatismes fréquents sur cette zone surtout lors de la traite, il apparaît un anneau blanc de kératine ⑪ qui évolue en stade rugueux si aggravation ⑫. Lorsque 10 % des vaches présentent des stades rugueux, il faut réagir.



GDS Bretagne



GDS Bretagne

→ À FAIRE :

- 1/ Stopper l'égouttage et les autres causes de surtraite
- 2/ Faire un contrôle Opti'Traite®
- 3/ Choisir des manchons adaptés à la forme des trayons.

→ Je vois des choses apparaître surtout après la traite

C'est anormal lorsque 10 % des vaches présentent l'un de ces signes en fin de traite. Ces lésions sont liées aux agressions répétées parfois excessives du manchon trayeur. Elles mettent en cause la machine à traire ou la technique de traite.

- La **congestion** ⑬ modifie la couleur de la peau (violette, rouge) alors que l'œdème ⑭ déforme le trayon. Dans les deux cas, c'est à cause d'une compression anormale de l'extrémité du trayon.



I. Leperlier



GDS Bretagne

- **Pétéchies** (microhémorragies) ⑮ : des gouttelettes de sang apparaissent sous la peau au bout du trayon, à cause de petites agressions répétées.



GDS Bretagne

- **Anneau de compression** ⑯ : Un bourrelet est parfois visible à la base du trayon. C'est problématique si le bourrelet persiste et est palpable aussi à l'intérieur.



J.F. Labbé

→ À FAIRE :

- 1/ Stopper l'égouttage, la surtraite
- 2/ Vérifier la qualité des manchons (usure, déformation, dureté)
- 3/ Vérifier la machine à traire Opti'Traite®
- 4/ Vérifier la dépose automatique avec Dépos'Traite®

Enfin, si tout a été vérifié, corrigé, et que les signes persistent, des tests de la machine sont possibles pendant la traite.

Ivanne Leperlier - GDS Bretagne
Christophe Mompas - GTV Pays de Loire
Pour le groupe qualité du lait