

**LUTTE CONTRE LES CULICOIDES, VECTEURS DE LA FCO :  
DESINSECTISATION DES ANIMAUX, DES BATIMENTS ET DES MOYENS DE TRANSPORT**

**DESINSECTISATION DES ANIMAUX :**

- Prescription et délivrance par votre vétérinaire d'un insecticide avec AMM
- Port de gants et d'un masque à cartouche filtrante et de lunettes en cas de pulvérisation
- Respectez les dosages et fréquences. Préparez la solution au moment de l'utilisation
- Produits « pour-on » : versez le liquide sur la ligne du dos (de l'encolure à la base de la queue)
- Produits à pulvériser : répartissez la solution de façon homogène sur le corps de l'animal

**Insecticides utilisables sur les animaux (liste non exhaustive)**

Nom	Application	Espèces	Temps d'attente (jours)		Action (semaines)
			Viande	Lait	
Butox 50 ‰	solution externe	BV, OV	28	1	Variable
Butox 7,5	pour on	BV, OV	BV :18, OV :2	BV :0, 2,5 (tiques), OV :0,5	8 à 10
Dectostop	pour on	BV, OV	BV :18, OV :35	BV :0, OV :1	4 à 6
Deltanil	pour on	BV, OV	BV :17, OV :35	0	4 à 8
Versatrine	pour on	BV, OV	BV :18, OV :28	BV :0, OV :1	4 à 6
Acadrex	solution externe	BV	28	7	3 à 4
Arkofly	spray	BV	28	7	2 à 4
Electron	boucle	BV	0	0	variable

BV : bovins, OV : ovins. Caprins : prescription vétérinaire hors AMM (modalités et temps d'attente)

**DESINSECTISATION DES LOCAUX ET DES MOYENS DE TRANSPORT :**

- Aucun produit ne dispose en Europe d'une autorisation spécifique pour les culicoides
- Privilégier l'emploi des pyréthrinoïdes dont l'efficacité a été évaluée sur d'autres insectes
- Traiter en l'absence des animaux. Protégez les aliments
- Ne pas traiter l'environnement même aux abords des bâtiments
- Utilisez un insecticide homologué pour bâtiments d'élevage et matériel de transports des animaux
- Protégez-vous lors de l'application : gants, combinaison, masque à cartouche filtrante et lunettes
- Respectez les dosages, préparez la solution au moment de l'utilisation, pulvérisez finement
- Appliquez le produit sur des parois propres
- Pour salle de traite et aire d'attente au-dessus de la zone lavée quotidiennement, stabulation, locaux veaux et génisses. Pas de pulvérisation dans le local de stockage de lait, utiliser des granulés
- Rythme : se conformer à la notice d'emploi de chaque spécialité commerciale

**Insecticides utilisables pour les bâtiments et moyens de transport (liste non exhaustive)**

Nom	Application	Utilisation
Oxyfly	pulvérisation	bâtiment
Kelion	pulvérisation	bâtiment, transport
Mouxine	Pulvérisation, badigeonnage	bâtiment
Solfac	pulvérisation	bâtiment
Socitrine	pulvérisation	bâtiment, transport
Mouch'Clac	diffuseur	bâtiment, transport
K othrine	pulvérisation	bâtiment, transport
Solfac thermo	thermonébulisable	bâtiment, transport
Mefisto Shock	Thermonébulisable, pulvérisation	Insecticide et désinfectant
Sectine PTM	pulvérisation	bâtiment