

Les analyses recommandées



Remboursement par GDS Bretagne : analyses réalisées dans les 31 jours précédant la vente du bovin **100%** (vente à destination d'un élevage breton en ASDA verte). Dans les 31 jours suivant l'achat 50%.

Si vente ou achat d'une femelle ayant déjà vêlé :

 <div style="border: 2px solid red; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> <p>BVD*</p> <p>Bovin sans appellation non IPI = prise de sang PCR Si appellation non IPI = pas de prise de sang</p> </div> <p> au veau à naître si femelle gestante**</p>	<div style="border: 2px solid purple; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Paratuberculose</p> <p>Prise de sang sérologie</p> </div>	<div style="border: 2px solid purple; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Néosporose</p> <p>Prise de sang sérologie</p> </div>
--	--	---

Si vente ou achat de génisse de + 12 mois jusqu'au premier vêlage :

 <div style="border: 2px solid blue; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> <p>BVD*</p> <p>Bovin sans appellation non IPI = prise de sang PCR Si appellation non IPI = pas de prise de sang</p> </div> <p> au veau à naître si femelle gestante**</p>	<div style="border: 2px solid green; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Paratuberculose</p> <p>PCR sur bouse</p> </div>	<div style="border: 2px solid purple; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Néosporose</p> <p>Prise de sang sérologie</p> </div>
---	---	---

Si vente ou achat de génisse de - 12 mois :

 <div style="border: 2px solid blue; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> <p>BVD*</p> <p>Bovin sans appellation non IPI = prise de sang PCR Si appellation non IPI = pas de prise de sang</p> </div>	<div style="border: 2px solid blue; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Paratuberculose</p> <p>Prise de sang sérologie sur les mères des génisses vendues</p> </div>	<div style="border: 2px solid purple; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Néosporose</p> <p>Prise de sang sérologie</p> </div>
---	---	---

Si vente ou achat de mâle reproducteur :

 <div style="border: 2px solid red; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> <p>BVD*</p> <p>Bovin sans appellation non IPI = prise de sang PCR + sérologie Si appellation non IPI = sérologie pour mâle + 6 mois</p> </div>	<div style="border: 2px solid red; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Paratuberculose</p> <p>PCR sur bouse pour mâle + 12 mois</p> </div>	<div style="border: 2px solid purple; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Néosporose</p> <p>Prise de sang sérologie pour mâle + 6 mois</p> </div>
--	---	--



BVD : perte de **31€ par 1000 litres** de lait, avortement, mortalité veau

Paratuberculose : perte de **13€ par 1000 litres** de lait, mortalité adulte

Néosporose : joue un rôle dans **20%** des investigations avortements répétés

* Vérification appellation non IPI : www.gds-bretagne.fr

** Si femelle gestante (en + de l'appellation non IPI) : sérologie BVD sur la femelle, ou PCR BVD à réaliser sur le veau à naître.

Fusion ou reprise de troupeau ?
Installation?

Contactez-nous pour un accompagnement santé spécifique

N'oubliez pas d'envoyer les ASDA à GDS Bretagne accompagnées, si les conditions sont respectées, du document de dérogation IBR