



LUTTE CONTRE LES CULICOIDES, (vecteurs de FCO, MHE, ...) : désinsectisation des animaux, des bâtiments et des moyens de transport

Désinsectisation des animaux :

- Prescription et délivrance par votre vétérinaire d'un insecticide avec AMM
- Port de gants et d'un masque à cartouche filtrante et de lunettes en cas de pulvérisation
- Respectez les dosages et fréquences. Préparez la solution au moment de l'utilisation
- Produits « pour-on » : versez le liquide sur la ligne du dos (de l'encolure à la base de la queue)
- Produits à pulvériser : répartissez la solution de façon homogène sur le corps de l'animal

Insecticides utilisables sur les animaux (liste non exhaustive)

Nom	Application	Espèces	Temps d'attente (jours)		Action (semaines)
			Viande	Lait	
Butox 50 ‰/00	solution externe	BV, OV	28	1	Variable
Butox 7,5	pour on	BV, OV	BV :18, OV :2	BV :0, 2,5 (tiques), OV :0,5	8 à 10
Dectostop	pour on	BV, OV	BV :18, OV :35	BV :0, OV :1	4 à 6
Deltanil	pour on	BV, OV	BV :17, OV :35	0	4 à 8
Versatrine	pour on	BV, OV	BV :18, OV :28	BV :0, OV :1	4 à 6
Acadrex	solution externe	BV	28	7	3 à 4
Arkofly	spray	BV	28	7	2 à 4
Electron	boucle	BV	0	0	variable

BV : bovins, OV : ovins. Caprins : prescription vétérinaire hors AMM (modalités et temps d'attente)

Désinsectisation des locaux et des moyens de transport :

- Aucun produit ne dispose en Europe d'une autorisation spécifique pour les culicoides
- Privilégier l'emploi des pyréthriinoïdes dont l'efficacité a été évaluée sur d'autres insectes
- Traiter en l'absence des animaux. Protégez les aliments
- Ne pas traiter l'environnement même aux abords des bâtiments
- Utilisez un insecticide homologué pour bâtiments d'élevage et matériel de transports des animaux
- Protégez-vous lors de l'application : gants, combinaison, masque à cartouche filtrante et lunettes
- Respectez les dosages, préparez la solution au moment de l'utilisation, pulvériser finement
- Appliquez le produit sur des parois propres
- Pour salle de traite et aire d'attente au-dessus de la zone lavée quotidiennement, stabulation, locaux veaux et génisses. Pas de pulvérisation dans le local de stockage de lait, utiliser des granulés
- Rythme : se conformer à la notice d'emploi de chaque spécialité commerciale



Insecticides utilisables pour les bâtiments et moyens de transport (liste non exhaustive)

Nom	Application	Utilisation
Oxyfly	pulvérisation	bâtiment
Kelion	pulvérisation	bâtiment, transport
Mouxine	Pulvérisation, badigeonnage	bâtiment
Solfac	pulvérisation	bâtiment
Socatrine	pulvérisation	bâtiment, transport
Mouch'Clac	diffuseur	bâtiment, transport
K othrine	pulvérisation	bâtiment, transport
Solfac thermo	thermonébulisable	bâtiment, transport
Mefisto Shock	Thermonébulisable, pulvérisation	Insecticide et désinfectant
Sectine PTM	pulvérisation	bâtiment

Une question ? Un besoin d'information ? Contactez-nous !

GDS Bretagne
Ploufragan / Quimper / Rennes / Vannes
Siège social : 13, rue du Sabot - BP 28 - 22440 Ploufragan
Tél : 02.96.01.37.00

antenne.ploufragan@gds-bretagne.fr
antenne.quimper@gds-bretagne.fr
antenne.rennes@gds-bretagne.fr
antenne.vannes@gds-bretagne.fr

www.gds-bretagne.fr

